



INFORMATION CLINIENS

Facteurs antinucléaires et tests complémentaires dans les maladies auto immunes (MAI) systémiques

- En cas de suspicion de MAI systémique le test de dépistage et de référence est et reste la recherche de FAN en immunofluorescence (ACR 2010).
Si nécessaire + ADNn et cas très particulier demande spécifique de SSA
- **Les tests complémentaires** (ENA, ENA cytoplasmiques, Ac sclérodermie, DNA, dot foie) sont déclenchés par le laboratoire selon l'aspect des FAN ET LES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

les tests complémentaires en dot que nous pouvons déclenchés sont :

- ➔ recherche ENA nucléaire (Ac recherchés : nRNP, Sm, SSA 52 et 60 Kd, SSB, Scl70, Jo1, B, Nucléosome, Histone)
- ➔ recherche ENA cytoplasmique (Ac recherchés : Mitochondries, JO1, PL7, PL12, SRP et ribosomes)
- ➔ recherche Ac sclérodermie (10 Ac recherchés : SCL-70, CENP-A, CENP-B, PM-SCL100, PM-SCL75, Ku, RNA P III, U1-RNP, TH/To, Fibrillarin)
- ➔ recherche DOT Foie (Ac recherchés : Mitochondries, Gp210, SP100, LKM1, LC-1, SLA/LP et Actine)

Les bonnes pratiques de prescription



- ➔ Dépistage : **FAN + Renseignements cliniques**
- ➔ Suivi: FAN + R. Clin. et si antériorité positive : ECT, DNAn
(NB : chez femme enceinte ayant un lupus FAN + SSA)
- ➔ Ne pas de prescrire un ECT si FAN déjà rendu négatif

Les bonnes pratiques de prélèvement

Faire prélever un tube sec gel bouchon brique





Voir Schéma ci-joint de la démarche diagnostique

